

Herbizid - Empfehlung Mais 2020

Für die WSG Beratung Leer

**ohne Bodenherbizide der Wirkstoffe: S-Metolachlor,
Dimethenamid-P, Flufenacet, Pethoxamid, Terbutylazin**

Bez-St. Ostfr. Aurich
Fachgruppe Pflanzenbau/-schutz

Herbizid-Beispiele für Region Leer 2020

ohne Bodenherbizide der Wirkstoffe: S-Metolachlor, Dimethenamid-P, Flufenacet, Pethoxamid, Terbutylazin

Spritzfolgen: ohne Grasuntersaaten!

Breite Mischverunkrautung mit sicherere Rispe-, Hirse- und Unkrautwirkung

T1-Vorlage:

Vorwiegend
Bodenwirkung:

Adengo 0,25 – 0,3
Vorauslauf
(Sortenverträgl.
beachten!)


T2-Nachlage: Wahlmöglichkeiten

Laudis + B 235 1,5 + 0,3
(inkl. Finger- /Borstenhirsen)
+ evtl. ½ Gräserpartner

Elumis P Pack
Elumis + Peak** 0,8 +14g
(inkl. Borstenhirsen)

Callisto 0,5 – 0,75
+ B 235 0,2 - 0,3
+ evtl. ½ Gräserpartner

Sulcogan 0,5 – 0,75
+ B 235 0,2 - 0,3
+ evtl. ½ Gräserpartner



Gräsermittel: z.B. Samson 4 SC* oder alternativ Cato bzw. Titus als Nicosulfuron-freie Lösung

*Nicosulfuron-Auflagen beachten. **Peak: nur 1 x in 3 Jahreszeitraum. Rückwirkend ab 2017

Herbizid-Beispiele für Region Leer 2020

ohne Bodenherbizide der Wirkstoffe: S-Metolachlor, Dimethenamid-P, Flufenacet, Pethoxamid, Terbutylazin

Spritzfolgen: mit Grasuntersaaten

Breite Mischverunkrautung mit sicherere Rispe-, Hirse- und Unkrautwirkung

T1-Vorlage:

Vorwiegend

Bodenwirkung:

im Voraufbau
Activius SC 4,0
(5 m Gew-Abst. 90 % Düse
mind. 300 l Wasser,
max. 7,5 km/h, Wind
max. 3 m/Sek.)


T2-Nachlage: Wahlmöglichkeiten

Laudis + B 235 1,5 + 0,3
(inkl. Finger- /Borstenhirsen)
+ evtl. ½ Gräserpartner

Elumis P Pack
Elumis + Peak** 0,8 + 14g
(inkl. Borstenhirsen)

Callisto 0,5 – 0,75
+ B 235 0,2 - 0,3
+ evtl. ½ Gräserpartner

Sulcogan 0,5 – 0,75
+ B 235 0,2 - 0,3
+ evtl. ½ Gräserpartner



Gräsermittel: z.B. Samson 4 SC* oder alternativ Cato bzw. Titus als Nicosulfuron-freie Lösung

*Nicosulfuron-Auflagen beachten. **Peak: nur 1 x in 3 Jahreszeitraum. Rückwirkend ab 2017

Herbizid-Beispiele für Region Leer 2020

ohne Bodenherbizide der Wirkstoffe: S-Metolachlor, Dimethenamid-P, Flufenacet, Pethoxamid, Terbutylazin

Einmalanwendung:

Breite Mischverunkrautung; normales Hirseaufkommen

Laudis + B 235 2,0 + 0,3 U-saat fähig
+ evtl. ½ Gräserpartner

Zingis ist neu – Empfehlung unter Vorbehalt!

Zingis + Mero (FHS)
0,25 + 1,7
keine Gras-U-saaten!

Elumis P-Pack
überwiegend Blattwirkung:


Elumis P Pack U-saat fähig
Elumis + Peak** 0,8 + 14g

Einzelkomponenten mit
überwiegend Blattwirkung:

MaisTer Power 1,0 – 1,5
keine Gras-U-saaten!

Task 250 g + Callisto 0,7 U-saat fähig

enthalten
Gräsersulfonyle mit
zusätzl. Wirkung auf
Quecken, Jährige
Rispen,
Borstenhirsens;
Auflagen beachten!



Gräsermittel: z.B. Samson 4 SC* oder alternativ Cato bzw. Titus als Nicosulfuron-freie Lösung!

*Nicosulfuron-Auflagen beachten. **Peak: nur 1 x in 3 Jahreszeitraum. Rückwirkend ab 2017