

Herbizid - Empfehlung Mais 2022

Für die WSG Beratung Leer

**ohne Bodenherbizide der Wirkstoffe: S-Metolachlor,
Dimethenamid-P, Flufenacet, Pethoxamid, Terbutylazin**

Bez-St. Ostfr. Aurich
Fachgruppe Pflanzenbau/-schutz

Herbizid-Beispiele für Region Leer 2022

ohne Bodenherbizide der Wirkstoffe: S-Metolachlor, Dimethenamid-P, Flufenacet, Pethoxamid, Terbutylazin

Spritzfolgen: ohne Grasuntersaaten!

Breite Mischverunkrautung mit sicherere Rispe-, Hirse- und Unkrautwirkung

T1-Vorlage:

Vorwiegend
Bodenwirkung:

Adengo 0,25 – 0,3
Vorauslauf
(Sortenverträgl.
beachten!)


T2-Nachlage: Wahlmöglichkeiten

Laudis 1,5 – 1,8
+ Arrat + Dash 0,15 + 0,75
(inkl. Finger- /Borstenhirsen)
+ evtl. ½ Gräserpartner

Elumis P Pack
Elumis + Peak 1,0 + 16 g
(inkl. Borstenhirsen)

Callisto 0,8 – 1,0
+ Arrat + Dash 0,15 + 0,75
+ evtl. ½ Gräserpartner

Callisto 0,8 – 1,0
+ Peak 16 – 20 g
+ evtl. ½ Gräserpartner



Gräsermittel: z.B. Samson 4 SC* oder alternativ Cato bzw. Titus als Nicosulfuron-freie Lösung

***Nicosulfuron-Auflagen beachten: max. alle 2 Jahre auf derselben Fläche einsetzen!**

Herbizid-Beispiele für Region Leer 2022

ohne Bodenherbizide der Wirkstoffe: S-Metolachlor, Dimethenamid-P, Flufenacet, Pethoxamid, Terbutylazin

Spritzfolgen: mit Grasuntersaaten

Breite Mischverunkrautung mit sicherere Rispe-, Hirse- und Unkrautwirkung

T1-Vorlage:

Vorwiegend

Bodenwirkung:

im Voraufbau
Activius SC 4,0
(5 m Gew-Abst. 90 % Düse
mind. 300 l Wasser,
max. 7,5 km/h, Wind
max. 3 m/Sek.)


T2-Nachlage: Wahlmöglichkeiten

Laudis 1,5 – 1,8
+ Arrat + Dash 0,15 + 0,75
(inkl. Finger- /Borstenhirsen)
+ evtl. ½ Gräserpartner

Elumis P Pack
Elumis + Peak 0,8 + 14g
(inkl. Borstenhirsen)

Callisto 0,8 - 1,0
+ Arrat + Dash 0,15 + 0,75
+ evtl. ½ Gräserpartner

Callisto 0,8 – 1,0
+ Peak 16 – 20 g
+ evtl. ½ Gräserpartner



Gräsermittel: z.B. Samson 4 SC* oder alternativ Cato bzw. Titus als Nicosulfuron-freie Lösung

***Nicosulfuron-Auflagen beachten: max. alle 2 Jahre auf derselben Fläche einsetzen!**

Herbizid-Beispiele für Region Leer 2022

ohne Bodenherbizide der Wirkstoffe: S-Metolachlor, Dimethenamid-P, Flufenacet, Pethoxamid, Terbutylazin

Einmalanwendung:

Breite Mischverunkrautung; normales Hirseaufkommen

Laudis 1,5 -1,8
+ Arrat + Dash 0,15 +0,75
+ evtl. ½ Gräserpartner U-saat fähig

Zingis + Mero

Zingis + Mero (FHS)
0,29 + 2,0
keine Gras-U-saaten!

Elumis P-Pack
überwiegend Blattwirkung:

Elumis P Pack U-saat fähig
Elumis + Peak 0,8 +14g


Einzelkomponenten mit
überwiegend Blattwirkung:

MaisTer Power 1,3 – 1,5
keine Gras-U-saaten!

Callisto 0,8 – 1,0
+ Peak 16 – 20 g U-saat fähig
+ evtl. ½ Gräserpartner

enthalten
Gräsersulfonyle mit
zusätzl. Wirkung auf
Quecken, Jährige
Rispen,
Borstenhirsens;
Auflagen beachten!

BBCH



Gräsermittel: z.B. Samson 4 SC* oder alternativ Cato bzw. Titus als Nicosulfuron-freie Lösung!

*Nicosulfuron-Auflagen beachten: max. alle 2 Jahre auf derselben Fläche einsetzen!